

# オングリザ<sup>®</sup>錠 2.5mg 5mg を (表)

# 服用されている皆様へ (裏)




監修：宇都宮 一典 先生 (医療法人財団慈生会野村病院 内科 / 東京慈恵会医科大学 名誉教授)

## オングリザ<sup>®</sup>錠は、2型糖尿病のおくすりです。

オングリザ<sup>®</sup>は、インスリン分泌を促すホルモンであるインクレチンを分解する酵素(DPP-4)を阻害し、血糖値を下げるおくすりです。

### 飲み方…



通常は**1日1回5mg**を服用します。  
状態によっては**2.5mg**を1日1回服用します。

※ 医師・薬剤師の指示通りの用量を服用してください。  
医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

### 飲み忘れた場合

- \* 気が付いたときに1回分を飲んでください。
- \* 次の服用時間が近い場合は、飲まずに次の服用時間に1回分飲んでください。
- \* 2回分を一度に飲んではいけません。

※ 誤って多く飲んだ場合には、副作用の症状があらわれる可能性が高まりますので、医師又は薬剤師にご相談ください。

### このような点にご注意ください

- 低血糖をおこすことがありますので、十分ご注意ください。(ウラ面参照)
- 低血糖症状、めまい等があらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際にはご注意ください。
- 誤飲を避けるため、小児の手の届かないところで保管してください。

**KYOWA KIRIN**

## 副作用について

次のような症状があらわれた場合には、担当の医師または薬剤師へご相談ください。



低血糖症



激しい腹痛



呼吸困難・  
じんましん

※水泡、びらん等、他にも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師へご相談ください。

## 低血糖の症状

軽い

強い空腹感、倦怠感、悪心、手足の震え、脱力感、発汗、動悸など

眠気、強い疲労感、見にくい、集中できない、めまい、動作がぎこちないなど

重い

意識消失、けいれん、こん睡状態

※低血糖の症状には個人差があります。

## 低血糖症状があらわれたら

まずは糖分(砂糖、ブドウ糖、清涼飲料水など)を補給しましょう。

α-グルコシダーゼ阻害薬と同時服用中の方は、ブドウ糖を摂取してください。それでも症状が治まらない場合は、すぐに医療機関にご連絡してください。

病院施設名