

# ダーブロック錠を 服用されている患者さんへ

編集協力: 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 教授・診療科長 南学 正臣先生

大切な注意です。必ずお読みください。

## ダーブロック錠は、腎性貧血のお薬です


ダーブロック錠は、腎臓などにあるエリスロポエチンをつくる細胞にはたらきかけ、つくられるエリスロポエチン量を増加させます。エリスロポエチンは赤血球をつくるよう骨髄に刺激を送り、赤血球の量を増加させて貧血を改善します。

## 飲み方

- ダーブロック錠は1日1回服用します。  
コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- ダーブロック錠は、毎日、同じ時間帯に飲むことが大切です。
- 主治医の指示に従って、毎日同じ時間帯に服用するようにしましょう。
- ダーブロック錠は、食事前、食事後にかかわらず飲むことが可能です。
- 血液透析を受けている患者さんでは、血液透析を行う日と行わない日にかかわらず、ダーブロック錠を飲むことが可能です。

あなたの1回の用量は

mgです。




# ダーブロック錠 を服用されている患者さんへ

## ダーブロック錠を飲む前に

以下に当てはまる方は主治医にお伝えください。  
また、治療中に当てはまるようになった場合もお伝えください。

- 脳梗塞(脳の血管がつまる)、心筋梗塞(心臓発作)、肺塞栓症(肺の血管がつまる)と診断されたことがある  
または治療中
- 高血圧の治療中
- 悪性腫瘍(がん)と診断された、またはがんの治療中
- 眼(網膜;眼の奥にある光を感じる場所)の病気と診断されたことがある
- 肝臓が悪いといわれたことがある
- 妊娠中、または妊娠している可能性がある
- 授乳中



## 飲み忘れたとき

- 飲み忘れに気づいた時点で、飲み忘れた分(1回分)を服用してください。
- ただし、次の服用時刻が近い場合は、飲み忘れた分をとばして、次の服用時刻に1回分を服用してください。

**決して一度に2回分を服用しないでください。**

参考資料: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)「知っておきたい薬の知識」  
(令和元年10月、厚生労働省・日本薬剤師会作成) <https://www.pmda.go.jp/files/000226365.pdf>

本文書は、特に明記しない限り、ダーブロック錠の添付文書又は承認時評価資料に基づき作成しています。

病院・薬局名