

ダーブロック錠を 服用されている患者さんへ

編集協力: 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 教授・診療科長 南学 正臣先生

大切な注意です。必ずお読みください。

ダーブロック錠は、腎性貧血のお薬です


ダーブロック錠は、腎臓などにあるエリスロポエチンをつくる細胞にはたらきかけ、つくられるエリスロポエチン量を増加させます。エリスロポエチンは赤血球をつくるよう骨髄に刺激を送り、赤血球の量を増加させて貧血を改善します。

飲み方

- ダーブロック錠は1日1回服用します。
コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- ダーブロック錠は、毎日、同じ時間帯に飲むことが大切です。
- 主治医の指示に従って、毎日同じ時間帯に服用するようにしましょう。
- ダーブロック錠は、食事前、食事後にかかわらず飲むことが可能です。
- 血液透析を受けている患者さんでは、
血液透析を行う日と行わない日にかかわらず、
ダーブロック錠を飲むことが可能です。

あなたの1回の用量は

mgです。




ダーブロック錠 を服用されている患者さんへ

ダーブロック錠を飲む前に

以下に当てはまる方は主治医にお伝えください。
また、治療中に当てはまるようになった場合もお伝えください。

- 脳梗塞(脳の血管がつまる)、心筋梗塞(心臓発作)、肺塞栓症(肺の血管がつまる)と診断されたことがある
または治療中
- 高血圧の治療中
- 悪性腫瘍(がん)と診断された、またはがんの治療中
- 眼(網膜;眼の奥にある光を感じる場所)の病気と診断されたことがある
- 肝臓が悪いといわれたことがある
- 妊娠中、または妊娠している可能性がある
- 授乳中



飲み忘れたとき

- 飲み忘れに気づいた時点で、飲み忘れた分(1回分)を服用してください。
- ただし、次の服用時刻が近い場合は、飲み忘れた分をとばして、次の服用時刻に1回分を服用してください。

決して一度に2回分を服用しないでください。

参考資料: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)「知っておきたい薬の知識」
(令和5年10月、厚生労働省・日本薬剤師会作成) <https://www.pmda.go.jp/files/000226365.pdf>

本文書は、特に明記しない限り、ダーブロック錠の添付文書(電子添文)又は承認時評価資料に基づき作成しています。

病院・薬局名