

# ハルロピ® テープ

8mg/16mg/24mg/32mg/40mg

を使用されている方へ




# ハルロピ<sup>®</sup>テープ 8mg/16mg/24mg 32mg/40mg を使用されている方へ

ハルロピ<sup>®</sup>テープは1日1回貼りかえて使用するパーキンソン病のお薬です

## ハルロピ<sup>®</sup>テープを貼る場所

右図の ■ のいずれかに貼ってください。



皮膚への刺激をできるだけ減らすために、  
貼る場所は毎回変えてください。



赤みやかゆみ、傷などがある場所には  
貼らないでください。

## ハルロピ®テープの貼り方

1




貼る場所をよく拭いて清潔にしてください。また、しっかりと貼るために、水分や汗は十分に取り除いてください。

2



包装袋からお薬を取り出した後、貼る日付を記入してください。

3



「ここからはがす」と書かれた白いフィルム面を上にご覧ください。フィルム中央で折り返し、片方のフィルムをずらし、粘着面を少し出してください。



はがれやすくなるので、粘着面には触らないようにしてください。

4



貼る場所に粘着面をあて、フィルムをずらしながら貼ってください。もう一方も折り返して、フィルムをずらしながら貼ってください。

5



手のひらでお薬を押しさえ、しっかりと皮膚に密着させてください。

汗をかいてはがれやすい場合は、汗をかきにくい場所に貼りましょう。乾燥している場合もはがれの原因となります。乾燥する季節には普段からの保湿をしましょう。

## ハルロピ®テープのはがし方

皮膚を刺激しないように、ゆっくりとはがしましょう。



皮膚を押さえながら、毛の向きに沿ってゆっくりはがしてください。はがす角度は90~180°がはがれやすい\*とされています。

\*徳村文男 他, 医科学 Vol.71, No.11 (2001)

お風呂やシャワーの前にはがして、あがったときに新しいお薬に貼りかえることをおすすめします。



使用するお薬の組み合わせや増量・減量方法については、医師の指示に従ってください。医師の指示なしに使用量を変更・中止することは、絶対にしてはいけません。

## ハルロピ®テープを使用するときの注意

- ◆ 新しいお薬を貼る前に、必ず前回のお薬をはがしてください。
- ◆ お風呂やシャワーの時間を考慮し、毎日1回、同じ時間に貼りかえてください。
- ◆ **貼り忘れに気づいても絶対に2回分を1度に貼らないでください。**
- ◆ お薬の使用中に次のような症状があらわれた場合、医師または薬剤師に相談してください。
  - (1) 突然眠り込んだり、強い眠気が出るなどの症状。
  - (2) 幻覚や妄想、興奮、さく乱、せん妄などの精神症状。
  - (3) 高熱、意識障害、手足の震えや体のこわばり、ショック症状等の悪性症候群の症状。
  - (4) 病的な衝動(ギャンブル依存、買い物依存、過食、性的衝動など)を抑えられない症状。
  - (5) 悪心、嘔吐等の消化器症状。
  - (6) めまい、立ちくらみ、ふらつき等の起立性低血圧の症状。
  - (7) お薬を貼った場所がかゆくなる、赤くなる、かぶれるなどの皮膚症状。

協和キリン株式会社

HRP0069  
2022年6月作成  
KKC-2020-00351-2  
作成：協和キリン株式会社  
製造販売元：久光製薬株式会社 発売元：協和キリン株式会社  
®登録商標

# 協和キリン株式会社