

## フォゼベル錠 5mg フォゼベル錠 10mg フォゼベル錠 20mg フォゼベル錠 30mg

### 【この薬は？】

販売名	フォゼベル錠 5mg PHOZEVEL Tablets 5mg	フォゼベル錠 10mg PHOZEVEL Tablets 10mg	フォゼベル錠 20mg PHOZEVEL Tablets 20mg	フォゼベル錠 30mg PHOZEVEL Tablets 30mg
一般名	テナパノル塩酸塩 Tenapanor Hydrochloride			
含有量	1錠中テナパノル 塩酸塩 5.32mg (テナパノルとし て5mg)	1錠中テナパノル 塩酸塩 10.64mg (テナパノルとし て10mg)	1錠中テナパノル 塩酸塩 21.28mg (テナパノルとし て20mg)	1錠中テナパノル 塩酸塩 31.92mg (テナパノルとし て30mg)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、高リン血症治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、腸管からのリン吸収を低下させることにより、高リン血症患者の血中リン濃度を低下させます。

- ・次の病気の人に処方されます。

### 透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・2歳未満の人
- ・過去にフォゼベル錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・機械的消化管閉塞またはその疑いのある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・炎症性腸疾患の人
- ・下痢型過敏性腸症候群の人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

	開始量	最高量
1回量	5mg	30mg
飲む回数	1日2回 朝食及び夕食直前	

- ・症状、血清リン濃度の程度により飲む量が調節されます。
- ・血液透析中に排便を催すことが懸念される場合には、透析直前の投与を控え、朝夕以外の食直前に投与してもかまいません。

### ●どのように飲むか？

少量の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた場合は、気がついた時に早めに飲んでください。朝食の直前に飲み忘れた場合は、昼食の直前に飲んでかまいません。

ただし、次の飲む時間が極端に近い場合は、飲み忘れた1回分をとばして、次の時間に1回分を飲んでください。

### ●多く使用した時（過量投与時）の対応

下痢などの消化器症状があらわれる可能性があります。また、重い下痢や長く続く下痢の場合、脱水にいたる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、ただちに医師に連絡してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を飲み始めても、食事療法等によるリン摂取制限は指示どおりに続けてください。
- ・この薬を使用中は、定期的に血清リン、血清カルシウムおよび血清PTH（副甲状腺ホルモン）濃度の血液検査が行われます。
- ・この薬の使用により、下痢がおこることがあります。下痢に伴う口渇（こうかつ）や手足のしびれ、強い倦怠感（けんたいかん）、血圧低下等があらわれた場合には、すみやかに主治医に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
重度の下痢 じゅうどのげり	何度も水のような便が出る、下腹部の痛み、体がだるい

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	体がだるい
腹部	下腹部の痛み
便	何度も水のような便が出る

## 【この薬の形は？】

販売名	フォゼベル錠 5mg	フォゼベル錠 10mg	フォゼベル錠 20mg	フォゼベル錠 30mg
PTP シート				
形状	フィルム コーティング錠 	フィルム コーティング錠 	フィルム コーティング錠 	フィルム コーティング錠 
長さ	5.1mm (直径)	8.3mm (長径) 4.8mm (短径)	10.4mm (長径) 6.0mm (短径)	11.9mm (長径) 6.9mm (短径)
厚さ	2.6mm	3.4mm	4.3mm	4.9
重さ	51.5mg	103mg	206mg	309mg
色	ごく薄い黄色	黄色	黄赤色	暗黄赤色
識別 コード	KH701 (PTPシート に表示)	KH702 (PTPシート に表示)	KH703 (PTPシート に表示)	KH704 (PTPシートに 表示)

## 【この薬に含まれているのは？】

販売名	フォゼベル錠 5mg	フォゼベル錠 10mg	フォゼベル錠 20mg	フォゼベル錠 30mg
有効 成分	テナパノル塩酸塩		テナパノル塩酸塩	テナパノル塩酸塩
添加剤	黄色三二酸化鉄、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、トリアセチン、ヒプロメロース、没食子酸プロピル		黄色三二酸化鉄、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸、低置換度ヒドロキシ	黒酸化鉄、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸、低置換度ヒドロキシ

		ロピルセルロース、 トリアセチン、ヒプ ロメロース、没食子 酸プロピル	プロピルセルロー ス、トリアセチン、 ヒプロメロース、 没食子酸プロピル
--	--	--	---

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：協和キリン株式会社 (<https://www.kyowakirin.co.jp/>)

くすり相談窓口

電話：0120-850-150

受付時間：9時～17時30分

（土・日・祝日及び弊社休日を除く）