



Kyowa KIRIN



**ドボベツト<sup>®</sup>軟膏** をお使いの方へ

# ドボベツト<sup>®</sup>軟膏<sup>®</sup>をお使いの方へ

お薬を安全、適正に使用していただくために必ずお読みください。

使用にあたっては医師・薬剤師の指示に従ってください。

**1日1回適量を患部に塗ってください。**


## 適量の目安

1週間に使用する量は、両剤形を合わせて90gまでにしてください。

### ドボベツト<sup>®</sup>軟膏



人差し指の先から第1関節までを1単位 (FTU) として患部の広さ (大きさ) に合わせて塗ってください。1FTU は手のひら約2枚分<sup>\*</sup>(指を含む)の面積に相当します。




Finlay AY, et al. Lancet. 1989; 334: 155.

### ドボベツト<sup>®</sup>ゲル



手のひらや指に適量を出して塗ってください。1円玉大に出した量が、手のひら約2枚分<sup>\*</sup>(指を含む)の面積に相当します。

このお薬は  
振ってから使用  
してください。



※いずれも、約 0.5g として計算

裏面もお読みください。👉

## 注意

- 患部以外には使用しないでください。
- 顔面の皮疹および粘膜には使用しないでください。
- お薬を塗り終わった後は、手をよく洗ってください。
- 下記に当てはまる方は医師・薬剤師にその旨をお伝えください。
  - ほかの病院または皮膚科以外の診療科にも通っている方
  - ほかに使っているお薬がある方
  - 高カルシウム血症になったことがある方
  - 腎臓の病気がある・腎機能が低下している方
  - 妊婦または妊娠している可能性がある方、授乳中の方
- いつもと違う症状があらわれたら、すぐに医師にお伝えください。  
(かゆみ、はれ、刺激症状、けん怠感、脱力感、食欲不振など)
- 長期に渡って使用する場合は、定期的に医師の診察を受けましょう。
- 医療関係者の指示があった場合を除き、お薬を塗ったところをラップ等で被うことはしないでください。
- このお薬を他の人にあげないでください。
- 頭皮などに塗る際に、目に入らないように注意してください。

## 保管について

- 光の当たる場所や低温となる場所を避け、キャップをしめて室温で保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

病医院・薬局名

# **Dovobet.jp**

製品に関する情報をご提供しています。

レオファーマ株式会社

協和キリン株式会社