

医療関係者 各位

2020年11月

**消化管運動改善剤「ナウゼリン®細粒1%」**  
**欠品に関するお詫びとご協力をお願い**

謹啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。又、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造販売しております消化管運動改善剤「ナウゼリン®細粒1%」につきまして、粒度規格を満たす製剤を十分製造することができず、欠品が避けられない状況に至りました。現在、改善に取り組んでおりますが、供給再開の具体的な目途は立っておりません。

製薬会社として重要な使命である安定供給に関して、患者および医療関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

つきましては、下記の内容をご確認頂き、ご対応賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

## 1. 対象製品

製品名	包装形態	GS1コード (販売包装単位コード)	統一商品コード
ナウゼリン®細粒1%	バラ 500g	(01)14987057175291	057-17529-4

## 2. ご協力をお願い

本剤のご処方をお控え頂き、代替薬への変更、その他本剤以外による治療をご検討頂きたくお願い致します。

## 3. お問い合わせ先

協和キリン株式会社 品質保証部コールセンター

電話番号 : 0120-157-189

受付時間 : 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (土、日、祝日および弊社休日を除く)

以上

**【ナウゼリン®細粒 1%の効能及び効果】**

製品名	効能又は効果
ナウゼリン®細粒 1%	下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、上腹部不快感、腹痛、胸やけ、あい気） 成人：慢性胃炎、胃下垂症、胃切除後症候群 抗悪性腫瘍剤またはレポドバ製剤投与時 小児：周期性嘔吐症、上気道感染症 抗悪性腫瘍剤投与時

**【代替薬リスト（ナウゼリン®各製剤）】**

製品名	効能又は効果
ナウゼリン®錠 5	下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、上腹部不快感、腹痛、胸やけ、あい気） 成人：慢性胃炎、胃下垂症、胃切除後症候群 抗悪性腫瘍剤またはレポドバ製剤投与時 小児：周期性嘔吐症、上気道感染症 抗悪性腫瘍剤投与時
ナウゼリン®錠 10	
ナウゼリン®OD 錠 5	
ナウゼリン®OD 錠 10	
ナウゼリン® ドライシロップ	下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、腹痛） 小児：周期性嘔吐症、乳幼児下痢症、上気道感染症 抗悪性腫瘍剤投与時
ナウゼリン®坐剤 10	小児： 下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、腹痛） 周期性嘔吐症、乳幼児下痢症、上気道感染症 抗悪性腫瘍剤投与時
ナウゼリン®坐剤 30	
ナウゼリン®坐剤 60	成人： 下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、上腹部不快感、胸やけ） 胃・十二指腸手術後 抗悪性腫瘍剤投与時

**【代替薬リスト（ナウゼリン®細粒 1%に類似する効能又は効果を有する散剤・細粒剤）】**

製品名（製造販売元）	効能又は効果
ガスモチン散 1% （大日本住友製薬株式会社）	慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ、悪心・嘔吐） 経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X 線造影検査前処置の補助
メトクロプラミド細粒 2% 「ツルハラ」 （鶴原製薬株式会社）	次の場合における消化器機能異常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与時、胃内・気管内挿管時、放射線照射時、開腹術後 X線検査時のバリウムの通過促進