

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ——

## 使用上の注意 改訂のお知らせ

2022年1-2月

経皮吸収型 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

劇薬  
処方箋医薬品<sup>注)</sup>

ハルロピ®テープ 8mg  
ハルロピ®テープ 16mg  
ハルロピ®テープ 24mg  
ハルロピ®テープ 32mg  
ハルロピ®テープ 40mg

注) 注意—医師等の処方箋  
により使用すること

**HARUROPI®TAPE** ロピニロール塩酸塩経皮吸収型製剤

製造販売元

 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

発売元

**協和キリン株式会社**

東京都千代田区大手町1-9-2

このたび、標記製品の【使用上の注意】を以下のとおり改訂いたしましたのでご案内申し上げます。今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容】

〔 〃 〕：下線部改訂箇所

改 訂 後					現 行				
4. 副作用 (略) (2) その他の副作用					4. 副作用 (略) (2) その他の副作用				
頻度 種類	5%以上	1%以上 5%未満	1%未満	頻度不明 <sup>注1)</sup>	頻度 種類	5%以上	1%以上 5%未満	1%未満	頻度不明 <sup>注1)</sup>
<b>精神 神経系</b>	傾眠、ジ スキネジ ア	幻視、浮 動性めま い、体位 性めま い、頭痛、 不眠	錯覚、ジ ストニア、 幻聴、 リビドー 亢進、回 転性めま い	衝動制御障害 (病的賭博、病 的性欲亢進、 強迫性購買、 暴食等)、 <u>躁状 態</u>	<b>精神 神経系</b>	傾眠、ジ スキネジ ア	幻視、浮 動性めま い、体位 性めま い、頭痛、 不眠	錯覚、ジ ストニア、 幻聴、 リビドー 亢進、回 転性めま い	衝動制御障害 (病的賭博、病 的性欲亢進、 強迫性購買、 暴食等)
(略)					(略)				
注1) ロピニロール塩酸塩含有製剤を含む類薬で認めら れている副作用。 (略)					注1) ロピニロール塩酸塩含有製剤を含む類薬で認めら れている副作用。 (略)				

### 【改訂理由】

本剤と有効成分が同じであるロピニロール塩酸塩錠の【使用上の注意】の「副作用」の「その他の副作用」の項に「躁状態」が追記されたため、本剤の「その他の副作用」の項にも「躁状態」を追記いたしました。

---

【お問い合わせ先】

**協和キリン株式会社 くすり相談窓口**

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2

電話 0120-850-150

受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日及び弊社休日を除く）

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）」に改訂後の電子化された添付文書及び医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されますので、ご参照ください。